RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT

Le présent dépliant contient des renseignements utiles sur **VIBRAMYCIN** (capsules d'hyclate de doxycycline) et **VIBRA-TABS** (comprimés pelliculés d'hyclate de doxycycline). Veuillez le lire attentivement avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou de votre affection, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

ATTENTION : Ce médicament a été prescrit à VOTRE intention. N'en donnez pas à d'autres personnes, même si elles présentent des symptômes semblables aux vôtres; ce médicament pourrait leur nuire.

Qu'est-ce que VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS?

Ce médicament porte le nom **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**. Chaque comprimé contient 100 mg d'hyclate de doxycycline, son ingrédient médicinal. Chaque comprimé renferme aussi les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline, éthylcellulose, hypromellose, stéarate de magnésium-lauryl-sulfate de sodium, propylèneglycol, talc, bioxide de titane, jaune n^{o} 6 (F.D.C.) et hydroxyde d'aluminium. Chaque capsule contient 100 mg d'hyclate de doxycycline, son ingrédient médicinal. Chaque capsule renferme aussi les ingrédients non médicinaux suivants : cellulose microcristalline et stéarate de magnésium-lauryl-sulfate de sodium. La capsule même (l'enveloppe) se compose de gélatine, de bioxyde de soufre, de bioxyde de titane et de bleu n^{o} 1 (F.D.C.).

Les comprimés **VIBRA-TABS** sont de couleur orange, plats et ronds.
Les capsules **VIBRAMYCIN** sont de couleur bleue et ont la forme habituelle d'une capsule.

Les raisons d'utiliser VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Votre médecin vous a prescrit **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** pour traiter une infection bactérienne.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Vous ne devez pas prendre **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** si :
- vous êtes allergique à l'un des ingrédients de **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**, aux tétracyclines ou à l'un des ingrédients non médicinaux cités au début du dépliant.

- vous souffrez de myasthénie grave (une maladie neuromusculaire auto-immune chronique qui cause une faiblesse musculaire).

Avant de prendre VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Avant de commencer à prendre ce médicament vous devez informer votre médecin si :
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- vous allaitez ou avez l'intention de le faire. **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** n'est pas recommandé chez les femmes qui allaitent. La tétracycline peut passer dans le lait maternel.
- **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** est prescrit à un enfant et que votre enfant a moins de 8 ans. **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 8 ans.
- vous avez ou avez connu d'autres problèmes de santé, en particulier :
  - vous avez de la difficulté à avaler, ou avez un rétrécissement ou une obstruction de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac)
  - vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux que vous achetez sans ordonnance dans une pharmacie, un supermarché ou une boutique d'aliments santé.

La prise de VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS avec d'autres médicaments

- Il ne faut pas prendre **VIBRAMYCIN** et **VIBRA-TABS** avec de l'alcool, des barbituriques, de la phénytoïne, de la carbamazépine ou du méthoxyflurane*.

* Le méthoxyflurane n'est pas commercialisé au Canada.

Certaines substances médicamenteuses peuvent interagir avec **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**. Si vous prenez les médicaments ci-dessous, votre médecin décidera peut-être d'en modifier la posologie ou le mode d'emploi, ou encore de les remplacer :

- anticoagulants pris par la bouche
- pénicilline
- subsalicylate de bismuth
- antiacides contenant de l'aluminum, du calcium ou du magnésium; ces agents diminuent l'absorption de **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** et ne devraient pas être prescrits à des patients prenant **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**
- produits qui contiennent du fer; ces agents devraient être pris à un autre moment que **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**
- contraceptifs oraux; **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** peut en diminuer l'efficacité

Comment prendre VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Les antibiotiques, y compris **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**, ne doivent être utilisés que pour traiter les infections bactériennes. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales (p. ex. le rhume). Bien qu'il soit courant de se sentir mieux dès les premiers jours de traitement, il est important de continuer à prendre le médicament en suivant les instructions à la lettre. Si on omet de prendre des doses ou qu'on ne poursuit pas le traitement jusqu'à la fin, cela risque : (1) de réduire l'efficacité du traitement dans l'immédiat, et (2) d'augmenter la probabilité que la bactérie devienne résistante et ne puisse plus être éliminée par **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** ou d'autres antibiotiques dans le futur.

Suivez fidèlement les instructions de votre médecin en ce qui concerne les doses de **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** que vous devez prendre et le moment où vous devez les prendre.

Il faut avaler **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**, de préférence avec de la nourriture.

Quand prendre VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Il faut prendre **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** au moment d'un repas, ou après, avec un verre d'eau entier, pour éviter les risques d'irritation ou d'ulcération de l'œsophage (le conduit qui relie la bouche à l'estomac). Restez à la verticale (debout ou assis le dos droit), et ne vous allongez pas pendant au moins 1 à 2 heures, pour éviter une irritation directe de l'œsophage.

Dose oubliée

Si vous oubliez de prendre votre médicament à l'heure prévue, prenez-le le plus rapidement possible à moins qu'il ne soit presque temps de prendre la dose suivante. Dans ce cas, continuez à prendre votre médicament comme avant. Ne prenez jamais 2 doses à la fois.

Surdose

Il ne faut pas prendre un nombre plus élevé de comprimés ou de capsules que ce que votre médecin vous a prescrit.

En cas de surdose, téléphonez immédiatement à votre médecin, à votre pharmacien, ou à un **centre antipoison ou rendez-vous au service d'urgence le plus près**, même si vous n'avez pas de symptômes.

Utilisation appropriée de VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

- Suivez toutes les recommandations du médecin à la lettre.
- Si vous apprenez que vous êtes enceinte, cessez immédiatement de prendre **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** et consultez votre médecin.
- Si vous êtes sur le point de prendre un nouveau médicament, signalez à votre médecin et à votre pharmacien que vous prenez **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**.
- N'arrêtez pas de prendre votre médicament tant que votre médecin ne vous l'a pas indiqué, même si vous vous sentez mieux.
- N'utilisez pas **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** pour traiter un autre problème médical à moins d'avis contraire de votre médecin.

Effets secondaires et mesures à prendre

VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS peut causer des effets secondaires, mais ils sont en général mineurs et temporaires. Cependant, certains effets peuvent être plus graves et nécessiter une intervention médicale. **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS** peut causer les effets secondaires suivants : nausées, vomissements, diarrhée, perte d'appétit, douleurs abdominales, douleur en avalant ou difficulté à avaler, changement de couleur des dents, éruptions cutanées.

VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS peut augmenter la fréquence des candidoses vaginales (infection) et causer une hypertension intracrânienne (pression du sang élevée dans le cerveau).

Des réactions de photosensibilité et des coups de soleil ont été signalés chez certaines personnes traitées par des tétracyclines. Si vous prévoyez être exposé directement à la lumière du soleil, appliquez un écran solaire ou prenez d'autres mesures pour vous protéger. Évitez toute exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets artificiels. En cas de réaction phototoxique (p. ex. éruption cutanée), cessez de prendre votre médicament.

Si vous remarquez un des effets secondaires suivants lors de la prise de ce médicament, communiquez sans attendre avec votre médecin ou votre pharmacien :

- diarrhée, diarrhée aqueuse ou présence de sang dans les selles, accompagnées ou non de crampes à l'estomac et de fièvre; communiquez le plus rapidement possible avec votre médecin.

Si vous éprouvez un des effets secondaires suivants lors de la prise de **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS**, communiquez sans attendre avec votre médecin ou votre pharmacien et cessez de prendre le médicament :

- réaction allergique pouvant être accompagnée des symptômes suivants : difficulté à respirer, battements de cœur rapides, étourdissements, démangeaisons, éruptions cutanées et boursouflure de la peau.
- enflure des mains ou des pieds, douleurs musculaires ou articulaires et éruptions cutanées; ces symptômes peuvent être des signes de réaction auto-immune.

Si vous remarquez un effet inhabituel, ***quel qu'il soit***, pendant le traitement par **VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS,** communiquez sans délai avec votre médecin ou votre pharmacien, même si vous pensez qu'il n'y a pas de lien entre cet effet et le médicament, et que cet effet ne figure pas sur la liste des effets énumérés dans ce dépliant.

Comment conserver VIBRAMYCIN/VIBRA-TABS

Gardez le médicament à la température ambiante (de 15 à 30 °C).

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption qui figure sur l'emballage et l'étiquette.

Gardez toujours les médicaments hors de portée des enfants. Ce médicament pourrait leur nuire.